毒蘑菇中毒后能治愈吗?

目前对于毒蘑菇中毒尚无特效解毒 药。因此误食毒蘑菇中毒后,一定要及时到 医院就诊,催吐、洗胃、导泻、灌肠,尽早 排出毒素,对症治疗。



辨蘑菇是否含毒,一些民间鉴别有毒蘑菇的 方法也并不可靠,因此,**市民不应自行** 采食野生蘑菇。



如需获取更多健康相关资讯,请登录

广东省卫生健康委员会 wsjkw.gd.gov.cn

广东省疾病预防控制中心 cdcp.gd.gov.cn







广东疾控





广东省卫生健康委员会 广东省疾病预防控制中心

我省常见的毒蘑菇有哪些?

据统计,我省毒蘑菇种类有112种,中毒种类较多的有鹅膏菌、红菇、牛肝菌、丝盖伞、花褶伞等类群。其中最常见的毒蘑菇是铅绿褶菇,我省特有的剧毒蘑菇是白毒伞。



致命白毒伞(剧毒)

毒性(肝脏损害型) 中毒症状是开始主要为胃肠炎症状,然后会有 一假愈期,接着病情会急剧恶化。如果早期不 及时治疗,致死率很高。

致命白毒伞在广州3-4月大量生长





铅绿褶菇 毒性(胃肠炎型症状) 对肝等脏器和神经系统造成损害



灰花纹鹅膏 (剧毒)



簇生黄韧伞 (剧毒)



黄盖鹅膏白色变种 (剧毒)



粘盖包脚菇 (剧毒)

为什么我省经常有**毒蘑菇** 中毒的事件发生?

广东省气候多雨炎热,乡村的灌木丛、 草地等地常有毒蘑菇生长,市民常将野生毒 蘑菇当成可食野蘑菇食用而引起中毒。

如果不小心误食 会出现哪些**中毒**表现?

不同的毒蘑菇,因所含毒素不同,会有不同的中毒表现。比如有些中毒表现为呕吐、腹泻、腹痛;有些表现为流口水、大汗、瞳孔缩小、心率减慢、血压下降等,有时会出现幻觉;有些表现为溶血、急性肾脏损害;还有些刚开始表现为呕吐、腹泻、腹痛等症状,之后出现假象好转,若诊疗不及时,最后会出现肝、脑、心、肾等多器官损害并伴有烦躁不安、嗜睡等精神症状,甚至死亡。

